Protocole de recueil de salive pour un dépistage du SARS-CoV-2 (COVID-19) par PCR

Attendre 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliment, d'un brossage des dents ou d'un rinçage de la bouche

Avant le prélèvement, se désinfecter les mains par friction avec du gel hydroalcoolique.

Comment faire le prélèvement ?

Recueil sur écouvillon (coton-tige), conservation dans un tube



- Mettre l'écouvillon dans la bouche, comme une sucette
- Le laisser s'imprégner de salive **pendant une minute**
- Le retirer de la bouche
- Ouvrir le flacon avec précautions pour ne pas renverser le liquide
- Plonger l'écouvillon dans le tube et le tourner au moins 15 fois
- Casser la tige au niveau de la partie plus fine (voir schéma)
- Laisser l'écouvillon dans le tube
- **Bien refermer pour éviter toute fuite**

- Coller une étiquette SUR LE TUBE ou écrire directement sur le tube le nom, prénom et date de naissance
- Le mettre dans un sachet transparent avec un absorbant, fermer le sachet en enlevant la bande collante
- Mettre le premier sachet dans un deuxième sachet et le fermer
- Joindre la fiche de renseignements complétée (adresse complète, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale obligatoires) en l'insérant dans la poche sur le devant du sachet